



Ośrodek Rehabilitacji
Ptaków Chronionych
PTASI AZYL



PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU”

Gatunek: sikorki, muchołówki, pokrzewki, kopciuszkę, pleszki i inne ptaki owadożerne

Dieta:

- jajko gotowane na twardo
- mieszanka dla ptaków owadożernych (dostępna w sklepach zool)
- gammarus (dostępna w sklepach zool)
- świerszcze, larwy mączniaka (dostępna w sklepach zool)
- czerw pszczeli (świeży czyli żywy !!!!)
- mole woskowe
- twaróg tłusty
- tarta sepia (jako źródło wapnia) – dodawana do mieszanki przed karmieniem
- woda z witaminami (komercyjnie dostępnymi dla drobiu lub gołębi)

Karmienie:

Jajko można zetrzeć na drobnej tarce połączyć ze zmielonym gamma rusem, mieszanką dla owadożernych oraz twarogiem tak aby powstała masa z której można formować małe kulki (wielkości paznokcia).

Zaczynamy od pojenia, podając kilka kropli na końcówkę dzioba np. za pomocą pipety, obserwując jednocześnie czy ptak przetyka – jeśli nie istnieje ryzyko zachłyśnięcia i śmierci !

Zakładając że pojenie poszło bez problemów można przejść do karmienia podając jednorazowo 3-7 kulek do dzioba. Jeśli pisklą chce więcej oznacza że nadal jest głodne i trzeba zwiększyć porcję.

Ważne aby przy każdym karmieniu oferować owady – ponieważ są to gatunki typowo owadożerne.

Po karmieniu poimy (nasza mieszanka jest sucha i trzeba dostarczyć piskląciu wody aby się nie odwodniło). Można poić także w trakcie karmienia - kilka kropli i kulka pokarmu itp.

Karmienie powinno odbywać się w tempie dostosowanym do wieku i możliwości pisklącia – młodsze ptaki jedzą mniej z dłuższymi przerwami, starsze jedzą szybciej i więcej a potem biegną dalej do swoich spraw 😊

Owady:

- mączniaki zabijamy np. zalewając je wrzątkiem, przygotowujemy tyle owadów ile potrzeba na jedno karmienie czyli około 10 (to jedynie dodatek).

- świerszczom odrywamy głowy oraz odnóża które mogą drażnić przewód pokarmowy, pozostaje sam odwłok, który można zamoczyć w witaminach rozrobionych w wodzie przed podaniem. Wielkość świerszczy dostosowujemy do wielkości pisklącia. Świerszcze można posypać startą sepią.

Pory karmienia: co 1-2 h, od świtu do nocy.

Warunki przetrzymywania:

Pisklęta łyse lub nie do końca opierzone wymagają temperatury około 33C (przy tak wysokiej temperaturze ważne jest pojenie – ponieważ łatwo odwodnienie)

Starsze powinny mieć temperaturę otoczenia równą około 20C

Pisklęta podlatujące, samodzielnie się poruszające – temperaturę pokojową i powoli przyzwyczajając się do temperatur zewnętrznych.

Dogodną temperaturę najlepiej ustalić obserwując pisklą – jeśli jest apatyczne i nastroszone jest mu za zimno, jeśli siedzi w kacie w odstawionych skrzydłami i dyszy – temperatura jest za wysoka.

Każdy maluch musi mieć zapewniony spokój oraz czystość (dobrze sprawdzają się ręczniki papierowe)